

Mutation beim Weinroten Amarananten

Wenn der Weinrote Amarant die rote Farbe verliert – eine neue Farbmutation?

S. Heibges (42562)



1: Hahn-Farbmutation?

Fotos: Verfasser

In allen Sprachen enthält der Artname dieser Prachtfinkenart die Farbgebung „weinrot“ der Wildform. Eine neue Farbmutation, die bei einem jungen Zuchtpaar in der Nachzucht aufgetreten ist bringt mich ins Grübeln bei der Namensgebung. Diese Mutation



2



3: Zuchtpaar (re.) mit einem Jungvögel (li.) in der Zuchtbox.

zeichnet sich durch völligen Verlust des Rotanteils im Gefieder aus. Am deutlichsten zeigt sich die Mutation im Hahnengefieder. Ich würde sie „Weinrote Amarant Rehbraun“ oder „Weinroter Amarant Fawn“ bezeichnen.

Beschreibung des Hahnes

Größe: ca. 10 cm (mit Schwanz)

Augen: Schwarz mit hellem, blaugrauem Lidrand

Schnabel: grau grünlich mit dunkler Spitze

Schnabel Wildform: Blaugrau mit dunkler Spitze, zur Schneidfläche hin dunkler

Gefieder: Schwarzes Gefieder am Kopf im Keh- und Wangenbereich. Die Schwanzunterdecke und Teile des Bauchgefieders sind dunkelgrau bis schwarz. Der Scheitel ist ein dunkles grau und zu den Wangen farblich deutlich abgesetzt. Am Nackengrund geht die graue Farbe des Scheitels fließend in das ockerfarbene Rückengefieder über. Der Bürzel ist etwas farbintensiver hellbraun gezeichnet. Die Schwungfedern an Hand- und Armschwinge sind mit dunkleren farbreichen und fast schon grünlichen Farbpartien besetzt. Die Eckflügel sind etwas dunkler.




easyyem
"für vögel"

650 g / 18.50 €

Eiweiß in Pulverform

Tel : 02151 / 363 60 99 • Fax : 363 60 97 • e-mail : info@easyyem.com • www.easyyem.com



4: Junge Henne.

Das Bauchgefieder ist rehfarben mit leichtem Grauschleier. Im Flankenbereich sind auch bei der Mutation die weißen Tüpfelungen im Gefieder wieder gegeben.

Die klassische Musterung der Wildform des Weinroten Amaranthen (Bild 2) ist bei der Mutation komplett erhalten geblieben, nur der Rotanteil ist aus der Befiederung verschwunden.

In Fitness, Körpergröße und Verhalten unterscheidet sich die Mutation nicht von der Wildform.

Diese Mutation ist beim Weinroten Amaranthen spontan aufgetreten und durchaus attraktiv. Es lohnt sich noch ein paar Bilder von dieser neuen Farbvariante anzusehen.



5: Junge Henne.

Weitere Informationen zur Haltung und Zucht von Weinroten Amaranthen und anderen Prachtfinkenarten finden Sie auf meiner Internetpräsenz unter www.skybeauties.com

Hinweis des Obmanns: siehe Bericht AZV 2012, Seite 13



6: Junger Hahn.



7: Junger Hahn.

Was wünschen Sie?

- * Verbesserte Befruchtungsrates?
- * Verbesserte Eierschalenqualität?
- * Verbesserte Schlupfrates?
- * Verminderte Legeprobleme?
- * Mehr Eier?
- * Mehr Jungvögel? * Mehr Schausieger!



Oder einfach mehr Sex zu Hause ?

Mit dem Zusatzsystem der Birdcare Company ist ALLES MÖGLICH !



Daily Essentials3: 100g €8,60; 400g €18,00	EasyBird SuperBreeder:
Calcivet: 250ml €18,10; 500ml €32,40	100g €10,10; 300g €27,80;
ProBoost SuperMax: 100g €7,60; 360g €19,30	1kg €59,30
Potent Brew: 30ml €8,00; 100ml €15,90	

Wie verabreicht von vielen weltberühmten Züchtern!

- | | |
|--|--|
| * Zoo Hohlweg, Pfarrkirchen, Tel: 08561 910 950 | www.BirdcareCo.com/deutsch |
| * Papageientreff-Rheinheßen, Florheim, Tel: 06734 962884 | Email: Sales@BirdcareCo.com |
| * Zoo-Eck, Duisburg, Tel: 02033 187 576 | Telefon/Fax: 00 44 1453 835330 |
| * Gabi's Papageilenvilla, Salzgitter, Tel: 041 39 43 45 | The Birdcare Company |
| * Prachtfinken-Zentrum, Köln, Tel: 02203 623 41 | 21-22 Spring Mill IE., |
| * Zoo-Brugger, Wohnbrechts, Tel: 08385 9551 | Avering Rd, Nailsworth, Glos, GL6 0BS, England |

